

## О мерах борьбы с крестоцветной блошкой на посевах рапса ярового



Крестоцветные блошки – опасные вредители всходов рапса. Повреждает посевы рапса и других культур семейства капустных. Вредят жуки и личинки. Имаго мелкие, прыгающие с одноцветными или двуцветными надкрыльями. Личинки светло-желтые, червеобразные. Жуки вредят всходам рапса, выедая язвочки на листьях.

В дальнейшем листья засыхают и отмирают. В сухую жаркую погоду за один день способны уничтожить всходы. Блошки откладывают яйца на листьях. Вылупившиеся личинки вгрызаются в паренхиму листа и делают маленькие отверстия.

В период всходов при численности 3 жука/м<sup>2</sup> необходимо провести обработки одним из следующих инсектицидов, включенных в «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации в 2024 году»:

Основные правила проведения обработки: соблюдение сроков применения для выбранного препарата (фаза культуры, вредный объект); соблюдение параметров погодных условий (без осадков, ветер 3-4 м/сек, Т – не выше 20-25°C); строгое соблюдение регламента применения препарата согласно официальному документу «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации в 2024 году» (нормы расхода препарата, рабочей жидкости, кратность обработки и т.д.).

Консультации по применению пестицидов можно получить у специалистов районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Смоленской области, либо областного отдела защиты растений. Контактный телефон: (4812) 65-40-17.